

Seu procedimento será realizado pelo(a) Dr(a): _____

Endereço: _____

Data do procedimento: _____ Chegar às: _____

Observações: _____

O que comer no dia ANTERIOR à colonoscopia

Siga uma dieta com baixo teor de resíduos e não coma nada depois de iniciar a preparação intestinal. Coma o que for permitido, a menos que receba outra orientação do seu médico.

O que você PODE fazer

- Você pode tomar somente um café da manhã com baixo teor de resíduos. Alimentos para um café da manhã com baixo teor de resíduos incluem ovos, pão branco, queijo cottage, iogurte, cereais, café e chá.
- Você pode beber líquidos transparentes.

O que você NÃO PODE fazer

- Não beba leite e nem coma ou beba nada de cor vermelha ou roxa.
- Não tome bebidas alcoólicas.
- Não tome outros laxantes enquanto estiver tomando SUTAB.
- Não tome medicamentos orais menos de 1 hora do início de cada dose de SUTAB.
- Caso esteja tomando antibióticos de tetraciclina ou fluoroquinolona, ferro, digoxina, clorpromazina ou penicilamina, tome esses medicamentos pelo menos 2 horas antes e no mínimo 6 horas depois da administração de cada dose de SUTAB.

Líquidos que PODEM ser ingeridos

- Café ou chá (sem leite nem creme não lácteo)
- Suco de frutas (sem polpa)
- Gelatina (sem frutas ou outras coberturas)
- Água
- Caldo de galinha
- Refrigerantes transparentes (como ginger ale)

Lembrete importante para os pacientes

- SUTAB é um laxante osmótico indicado para a limpeza do cólon como parte do preparo para a colonoscopia em adultos.
- Certifique-se de informar ao seu médico todos os medicamentos que você usa, o que inclui medicamentos (receitados ou não), vitaminas e fitoterápicos. O SUTAB pode afetar o modo como outros medicamentos atuam.
- Medicamentos tomados por via oral podem não ser absorvidos adequadamente quando ingeridos menos de 1 hora antes do início de cada dose de SUTAB.
- As reações adversas mais comuns após a administração de SUTAB são náusea, distensão abdominal, vômitos e dor na parte superior do abdome.
- Foram relatados incidentes com pacientes que ingeriram o dessecante contido nos frascos. Certifique-se de descartar ambos os dessecantes conforme as instruções.
- Entre em contato com o seu prestador de serviços de saúde caso comece a vomitar de maneira intensa ou desenvolva sinais de desidratação após o uso de SUTAB, ou se apresentar arritmias cardíacas ou convulsões.
- Em caso de dúvidas sobre o uso do SUTAB, ligue para o seu médico.

Para saber mais sobre este produto, ligue para +1-800-874-6756.

SUTAB[®]
(sulfato de sódio, sulfato de magnésio e cloreto de potássio)
Comprimidos
1,479 g/0,225 g/0,188 g



Esquema posológico

SUTAB deve ser administrado em um esquema de dose dividida (2 dias). No total, devem ser tomados 24 comprimidos para completar o preparo para a colonoscopia. Você deverá tomar os comprimidos em duas doses de 12 comprimidos cada. É necessário tomar cada dose de SUTAB com água e beber mais água depois de cada dose.

Dia 1, Dose 1 — Na noite anterior à colonoscopia

Engula os 12 comprimidos com os primeiros 500 mL de água

ETAPA 1 Abra 1 frasco de 12 comprimidos. **Remova e descarte o dessecante.** Remova e descarte o dessecante do segundo frasco e feche-o. Use o segundo frasco para a segunda dose na manhã da colonoscopia.



ETAPA 2 Encha o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente). **Engula 1 comprimido a cada 1 a 2 minutos. Você deve tomar os 12 comprimidos e todos os 500 mL de água em 20 minutos.**



IMPORTANTE: Caso você apresente sintomas relacionados ao preparo (como náusea, estufamento ou cólicas), faça uma pausa ou reduza o ritmo de consumo da água adicional até a diminuição dos sintomas.

Beba os dois 500 mL adicionais de água

ETAPA 3 Cerca de **1 hora** após a ingestão do último comprimido, encha novamente o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente) e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

ETAPA 4 Cerca de **30 minutos** após beber o segundo recipiente com água, encha novamente o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente) e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

Dia 2, Dose 2 – Na manhã do dia da colonoscopia (5 a 8 horas antes da colonoscopia e não menos de 4 horas após o início da Dose 1)

Engula os outros 12 comprimidos com mais 500 mL de água

- Continue a ingerir apenas líquidos transparentes até o término da colonoscopia.
- Repita as Etapas 2 a 4 do Dia 1, Dose 1.
- Caso você apresente sintomas relacionados ao preparo (como náusea, estufamento ou cólicas), faça uma pausa ou reduza o ritmo de consumo da água adicional até a diminuição dos sintomas.
- Termine de tomar todos os comprimidos de SUTAB e a água até duas horas antes da colonoscopia.



Leia a bula completa e o Guia do Medicamento contidos no kit.

Fornecido como serviço educacional por

Braintree
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS[®]

©2024 Braintree Laboratories, Inc.

201-123-v4

Janeiro de 2024