

Thủ thuật của quý vị sẽ được thực hiện bởi Bác sĩ: _____

Địa chỉ: _____

Ngày làm thủ thuật: _____ Đến nơi lúc: _____ Sáng/Chi

Lưu ý: _____

Nên ăn những gì vào ngày TRƯỚC ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng

Hãy tuân theo chế độ ăn dễ tiêu và không ăn bất cứ thứ gì sau khi bắt đầu chuẩn bị ruột để nội soi đại tràng. Ăn những gì được cho phép trừ khi có chỉ dẫn khác của bác sĩ.

Những điều quý vị ĐƯỢC làm

- Quý vị chỉ được ăn sáng với những thức ăn dễ tiêu. Bữa sáng dễ tiêu gồm trứng, bánh mì trắng, phô mai cottage, sữa chua, grits (bắp nghiền), cà phê và trà.
- Quý vị có thể dùng chất lỏng trong suốt.

Những điều quý vị KHÔNG ĐƯỢC LÀM

- Không uống sữa hoặc ăn hoặc uống bất cứ thứ gì có màu đỏ hoặc màu tím.
- Không dùng thức uống có cồn.
- Không dùng các thuốc nhuận tràng khác trong khi dùng SUTAB.
- Không uống thuốc nào khác trong vòng 1 giờ trước khi bắt đầu dùng mỗi liều SUTAB.
- Nếu có dùng thuốc kháng sinh tetracycline hoặc fluoroquinolone, sắt, digoxin, chlorpromazine hoặc penicillamine, hãy dùng những thuốc này cách ít nhất là 2 giờ trước khi dùng mỗi liều SUTAB và cách không dưới 6 giờ sau khi dùng mỗi liều SUTAB này.

Những chất lỏng ĐƯỢC uống

- Cà phê hoặc trà (không kem hoặc kem béo thực vật)
- Nước ép trái cây (không có bã)
- Các món tráng miệng có thạch gelatin (không trái cây hoặc topping)
- Nước
- Nước súp gà (Chicken broth)
- Soda màu trong (như nước ngọt có ga ginger ale)

Lời nhắc quan trọng cho bệnh nhân

- SUTAB là thuốc nhuận tràng thẩm thấu được chỉ định để làm sạch đại tràng, chuẩn bị cho thủ thuật nội soi đại tràng ở người lớn.
- Hãy thông báo cho bác sĩ của quý vị biết tất cả các loại thuốc quý vị dùng, gồm cả thuốc theo toa và không theo toa, vitamin và chế phẩm bổ sung từ thảo dược. SUTAB có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc khác.
- Những thuốc quý vị cần uống có thể không hấp thu được đúng cách khi quý vị uống trong vòng 1 giờ đồng hồ trước khi bắt đầu dùng mỗi liều SUTAB.
- Những phản ứng bất lợi thường gặp nhất sau khi dùng SUTAB là buồn nôn, chướng bụng, nôn và đau bụng trên.
- Đã xảy ra trường hợp bệnh nhân nuốt phải gói hút ẩm có trong chai, vì vậy hãy nhớ vứt bỏ cả hai gói hút ẩm theo hướng dẫn.
- Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị bị nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước sau khi dùng SUTAB, hoặc nếu quý vị bị loạn nhịp tim hoặc co giật.
- Nếu quý vị có thắc mắc gì về việc dùng SUTAB, vui lòng gọi cho bác sĩ của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này, vui lòng gọi số 1-800-874-6756.

SUTAB[®]
(sodium sulfate, magnesium sulfate,
và potassium chloride)
Viên nén
1,479 g/0,225 g/0,188 g



Chế độ dùng thuốc

SUTAB là thuốc dùng theo chế độ phân liều (trong 2 ngày). Phải dùng tổng cộng 24 viên thuốc để chuẩn bị đầy đủ cho thủ thuật nội soi đại tràng. Quý vị sẽ chia số viên thuốc thành hai liều để uống, mỗi liều 12 viên. Uống mỗi liều SUTAB với nước, xong uống thêm nước sau mỗi liều.

Ngày 1, Liều 1 – Vào buổi tối trước ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng

Nuốt 12 viên thuốc với 16 ounce nước đầu tiên

BƯỚC 1 Mở 1 chai thuốc gồm 12 viên nén. **Lấy gói hút ẩm và vứt bỏ. Lấy ra và vứt bỏ gói hút ẩm** trong chai thuốc thứ hai và đóng chai thuốc. Sử dụng chai thuốc thứ hai cho liều thứ hai vào buổi sáng ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng.



BƯỚC 2 Đổ đầy 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (đến vạch báo đầy). **Nuốt 1 viên thuốc sau mỗi 1 đến 2 phút. Quý vị cần uống hết 12 viên thuốc và toàn bộ 16 ounce nước trong vòng 20 phút.**



Viên thuốc trong hình không đúng với kích thước thực tế.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu quý vị gặp những triệu chứng trong lúc dùng thuốc để chuẩn bị làm thủ thuật nội soi này (như buồn nôn, đầy hơi hoặc đau bụng), hãy tạm dừng hoặc uống nước chậm lại cho đến khi những triệu chứng này giảm bớt.

Uống thêm hai ly nước 16 ounce

BƯỚC 3 Khoảng 1 giờ sau khi uống viên thuốc cuối cùng, một lần nữa rót 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (đến vạch báo đầy) và uống toàn bộ lượng nước trong vòng 30 phút.

BƯỚC 4 Khoảng 30 phút sau khi uống hết ly nước thứ hai, rót 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (đến vạch báo đầy) và uống toàn bộ lượng nước trong vòng 30 phút.

Ngày 2, Liều 2 – Buổi sáng ngày làm thủ thuật nội soi đại tràng

(5 đến 8 giờ trước khi nội soi đại tràng và không sớm hơn 4 giờ kể từ khi bắt đầu Liều 1)

Nuốt 12 viên thuốc khác với 16 ounce nước khác

- Tiếp tục chỉ uống chất lỏng trong suốt cho đến sau khi nội soi đại tràng.
- Lặp lại Bước 2 đến Bước 4 từ Ngày 1, Liều 1.
- Nếu quý vị bị các triệu chứng liên quan đến việc chuẩn bị nội soi đại tràng (ví dụ: buồn nôn, đầy hơi hoặc chuột rút), hãy tạm dừng hoặc giảm tốc độ uống nước bổ sung cho đến khi các triệu chứng thuyên giảm.
- Hoàn thành việc uống tất cả các viên SUTAB và nước ít nhất hai giờ trước khi nội soi đại tràng.



Viên thuốc trong hình không đúng với kích thước thực tế.

Vui lòng đọc toàn bộ phần Thông tin thuốc theo toa và Hướng dẫn dùng thuốc trong bộ thuốc.

Được cung cấp theo dịch vụ hướng dẫn của

Brantree
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS[®]

©2024 Brantree Laboratories, Inc.

201-123-4

Tháng 1 năm 2024