

DANE DOSTAWCY USŁUG MEDYCZNYCH

Nazwa: _____

Adres: _____

Miejscowość: _____

Stan: _____ Kod pocztowy: _____

Telefon: _____ Faks: _____

SUTAB[®]
(siarczan sodu, siarczan magnezu
i chlorek potasu)
Tabletki
1,479 g/0,225 g/0,188 g



Dawkowanie

SUTAB podawany jest w dawkach podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Do pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są łącznie 24 tabletki. Tabletki będą przyjmowane w dwóch dawkach, z których każda składa się z 12 tabletek. Każdą dawkę preparatu SUTAB należy przyjmować popijając wodą oraz konieczne będzie wypicie dodatkowej ilości wody po przyjęciu każdej dawki.

Przed, w trakcie i po przyjęciu preparatu SUTAB należy przyjąć odpowiednią ilość płynów.

Dzień 1, dawka 1 — wieczorem na dzień przed zabiegiem kolonoskopii

12 tabletek należy połknąć, popijając pierwszą objętością 16 uncji wody.

W dniu poprzedzającym kolonoskopię należy otworzyć pierwszą butelkę zawierającą 12 tabletek i przyjąć SUTAB zgodnie z poniższymi wskazówkami.

KROK 1 Otworzyć jedną butelkę zawierającą 12 tabletek. **Wyjąć i wyrzucić środek osuszający. Wyjąć i wyrzucić środek osuszający** z drugiej butelki, po czym ją zamknąć. Użyć drugiej butelki jako drugiej dawki rano w dniu kolonoskopii.



KROK 2 Napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia).



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)



Połykać 1 tabletkę co 1 do 2 minut. Przyjmowanie 12 tabletek i całej objętości 16 uncji wody należy zakończyć w ciągu 20 minut.

WAŻNE: W przypadku wystąpienia objawów związanych z preparatem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zmniejszyć tempo przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.

Wypić jeszcze dwie objętości po 16 uncji wody.

KROK 3 Po upływie około **1 godziny** od momentu połknięcia ostatniej tabletki należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

KROK 4 Po upływie około **30 minut** od wypicia zawartości drugiego pojemnika z wodą należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

Dzień 2, dawka 2 — rano w dniu kolonoskopii (5 do 8 godzin przed kolonoskopią, ale nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki 1)

Kolejną dawkę 12 tabletek należy połknąć, popijając drugą objętością 16 uncji wody.

• Do czasu wykonania kolonoskopii należy kontynuować przyjmowanie wyłącznie klarownych płynów.

• Powtórzyć krok 2 do kroku 4 z dnia 1, dawki 1.

• W przypadku wystąpienia objawów związanych z preparatem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zmniejszyć tempo przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.

• Wszystkie tabletki preparatu SUTAB należy przyjąć oraz wypić wodę na co najmniej na dwie godziny przed kolonoskopią.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)



