

## INFORMAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Nome: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**SUTAB<sup>®</sup>**  
(sulfato de sódio, sulfato de  
magnésio e cloreto de potássio)  
Comprimidos  
1,479 g/0,225 g/0,188 g



### Esquema posológico

SUTAB deve ser administrado em um esquema de dose dividida (2 dias). No total, devem ser tomados 24 comprimidos para completar o preparo para a colonoscopia. Você deverá tomar os comprimidos em duas doses de 12 comprimidos cada. É necessário tomar cada dose de SUTAB com água e beber mais água depois de cada dose.

Recomendamos que você se **hidrate adequadamente antes, durante e depois** de tomar SUTAB.

### Dia 1, Dose 1 — Na noite anterior à colonoscopia

#### Engula os 12 comprimidos com os primeiros 500 mL de água

No dia anterior à colonoscopia, abra o primeiro frasco de 12 comprimidos e tome SUTAB conforme descrito abaixo.

**ETAPA 1** Abra 1 frasco de 12 comprimidos. **Remova e descarte o dessecante.**

**Remova e descarte o dessecante** do segundo frasco e feche-o. Use o segundo frasco para a segunda dose na manhã da colonoscopia.



**ETAPA 2** Encha o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente).



**Engula 1 comprimido a cada 1 a 2 minutos. Você deve tomar os 12 comprimidos e todos os 500 mL de água em 20 minutos.**

**IMPORTANTE:** Caso você apresente sintomas relacionados ao preparo (como náusea, estufamento ou cólicas), faça uma pausa ou reduza o ritmo de consumo da água adicional até a diminuição dos sintomas.

#### Beba os dois 500 mL adicionais de água

**ETAPA 3** Cerca de **1 hora** após a ingestão do último comprimido, encha novamente o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente) e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

**ETAPA 4** Cerca de **30 minutos** após beber o segundo recipiente com água, encha novamente o recipiente fornecido com cerca de 500 mL de água (até a linha marcada no recipiente) e beba todo o volume em um período de 30 minutos.

### Dia 2, Dose 2 – Na manhã do dia da colonoscopia (5 a 8 horas antes da colonoscopia e não menos de 4 horas após o início da Dose 1)

#### Engula os outros 12 comprimidos com mais 500 mL de água

• Continue a ingerir apenas líquidos transparentes até o término da colonoscopia.

• Repita as Etapas 2 a 4 do Dia 1, Dose 1.

• Caso você apresente sintomas relacionados ao preparo (como náusea, estufamento ou cólicas), faça uma pausa ou reduza o ritmo de consumo da água adicional até a diminuição dos sintomas.

• Termine de tomar todos os comprimidos de SUTAB e a água até duas horas antes da colonoscopia.



