

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Название: _____

Адрес: _____

Город: _____

Штат: _____ Индекс: _____

Телефон: _____ Факс: _____

SUTAB®

(натрия сульфат, магния сульфат
и калия хлорид)
таблетки
1,479 г/0,225 г/0,188 г



Режим дозирования

Препарат SUTAB принимается в течение двух дней. В общей сложности для полной подготовки к колоноскопии требуется 24 таблетки. Вам следует принять две дозы, по 12 таблеток каждая. Каждую дозу препарата SUTAB надо обязательно запивать водой. После каждой дозы обязательно следует выпить дополнительное количество воды.

Вам рекомендуется **пить воду**
в достаточном количестве до,
во время и после приема SUTAB.

День 1, доза 1: вечером в день перед колоноскопией

Примите 12 таблеток и запейте первыми 16 унциями (473 мл) воды

За день до колоноскопии откройте первый флакон с 12 таблетками и примите SUTAB, как описано ниже.

ШАГ 1. Откройте 1 флакон с 12 таблетками. **Удалите и выбросьте влагопоглотитель.**

Удалите и выбросьте влагопоглотитель из второго флакона и закройте флакон.

Используйте второй флакон для приема второй дозы утром в день колоноскопии.

ШАГ 2. Налейте в стаканчик, поставляемый вместе с таблетками, 16 унций (473 мл) воды (до риски).

Принимайте по 1 таблетке каждые 1-2 минуты.
Вам нужно принять 12 таблеток и выпить все 16 унций (473 мл) воды в течение 20 минут.



Размер таблеток, представленных на рисунке, отличается от реального.



ВАЖНО! Если у вас появились симптомы, связанные с подготовкой к исследованию (например, тошнота, вздутие живота или спазмы), сделайте небольшую паузу или пейте дополнительное количество воды медленнее, пока симптомы не ослабнут.

Выпейте дополнительные две порции по 16 унций (473 мл) воды

ШАГ 3. Приблизительно через **1 час** после приема последней таблетки снова наполните стаканчик, поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (473 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в течение 30 минут.

ШАГ 4. Приблизительно через **30 минут** после того как будет выпит второй стаканчик воды, наполните стаканчик, поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (473 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в течение 30 минут.

День 2, доза 2: утром в день колоноскопии (за 5–8 часов

до колоноскопии и не раньше чем через 4 часа после начала приема дозы 1)

Примите еще 12 таблеток и запейте их 16 унциями (473 мл) воды

- До завершения колоноскопии употребляйте только прозрачные жидкости.
- Повторите шаги 2–4, перечисленные для приема дозы 1 в день 1.
- Если у вас появились симптомы, связанные с подготовкой к исследованию (например, тошнота, вздутие живота или спазмы), сделайте небольшую паузу или пейте дополнительное количество воды медленнее, пока симптомы не ослабнут.
- Вы должны принять все таблетки SUTAB и выпить все необходимое количество воды не менее чем за два часа до колоноскопии.



Размер таблеток, представленных на рисунке, отличается от реального.



(См. дополнительные указания на следующей странице.)

Что можно есть за день ДО колоноскопии

Просим соблюдать высокоусвояемую диету и не принимать пищу после начала подготовки кишечника. Ешьте разрешенные продукты, если иное не предписано врачом.

Что вы **МОЖЕТЕ** делать

- Вы можете съесть только высокоусвояемый завтрак. Высокоусвояемые продукты на завтрак - это яйца, белый хлеб, творог, йогурт, крупы, кофе и чай.
- Вы можете пить прозрачные жидкости.

Чего вам **НЕЛЬЗЯ** делать

- Нельзя пить молоко, есть и пить продукты красного или пурпурного цвета.
- Нельзя употреблять спиртные напитки.
- В период приема препарата SUTAB® (натрия сульфат, магния сульфат и калия хлорид) нельзя употреблять другие слабительные средства.
- Нельзя принимать пероральные препараты в течение 1 часа до начала приема каждой дозы препарата SUTAB.
- Если вы принимаете антибиотики тетрациклинового или фторхинолонового ряда, препараты железа, дигоксин, хлорпромазин или пеницилламин, то эти препараты следует принимать не менее чем за 2 часа до и не менее чем через 6 часов после приема каждой дозы препарата SUTAB.

Жидкости, которые **МОЖНО** пить

- Кофе или чай (без сливок и искусственных забеливателей)
- Фруктовые соки (без мякоти)
- Желе (без фруктов или топпинга)
- Вода
- Куриный бульон
- Прозрачные газированные напитки (например, имбирный лимонад)

Важное напоминание для пациентов

- SUTAB — это осмотическое слабительное средство, предназначенное для очищения толстой кишки при подготовке к колоноскопии у взрослых.
- Обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и растительные добавки. Препарат SUTAB может повлиять на действие других лекарств.
- Если лекарство было принято перорально в течение 1 часа перед приемом любой дозы препарата SUTAB, то его всасывание может происходить не в полной мере.
- Наиболее распространенными нежелательными реакциями после приема препарата SUTAB были тошнота, вздутие живота, рвота и боли в верхней части живота.
- Сообщалось о случаях, когда пациенты проглатывали влагопоглотитель, содержащийся во флаконах; обязательно выбросьте оба влагопоглотителя в соответствии с инструкцией.
- Если после приема препарата SUTAB у вас возникнет сильная рвота или появятся признаки обезвоживания, нарушения сердечного ритма или судороги, вам следует обратиться в медицинское учреждение.
- Если у вас возникнут вопросы по поводу приема препарата SUTAB, пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

(См. дополнительные указания на следующей странице.)

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ВРАЧА

ВАША ПРОЦЕДУРА

Время/дата: _____

Местоположение: _____

При возникновении каких-либо вопросов следует обратиться в медицинское учреждение:

Необходимо прочитать полную инструкцию по применению препарата и листок-вкладыш, поставляемые в комплекте.

Подробную информацию о препарате вы можете получить по телефону 1-800-874-6756.

Предоставляется в качестве образовательной услуги компанией

 **Braintree**
A PART OF SEBELA PHARMACEUTICALS*