

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____ Código postal: _____

Teléfono: _____ Fax: _____

SUTAB[®]

(sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de potasio) en comprimidos
1.479 g/0.225 g/0.188 g



Esquema de administración

SUTAB es un tratamiento de dosis fraccionada (2 días). Se requiere un total de 24 comprimidos para la preparación completa para una colonoscopia. Usted tomará los comprimidos en dos dosis de 12 comprimidos cada una. Cada dosis de SUTAB debe beberse con agua, y debe beberse más agua luego de cada dosis.

Le recomendamos que se mantenga bien hidratado antes, durante y después de tomar SUTAB.

Día 1, dosis 1; en la noche anterior a la colonoscopia

Trague los 12 comprimidos con las primeras 16 onzas de agua

El día anterior a la colonoscopia, abra el primer frasco de 12 comprimidos y tome SUTAB como se describe a continuación.

PASO 1 Abra un frasco de 12 comprimidos. **Retire y deseche el desecante.**

Retire y deseche el desecante del segundo frasco y cierre el frasco.

Use el segundo frasco para la segunda dosis en la mañana de la colonoscopia.



PASO 2 Llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado).

Trague un comprimido cada uno o dos minutos. Debe tomar los 12 comprimidos y las 16 onzas de agua en menos de 20 minutos.



IMPORTANTE: Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.

Beba los 2 recipientes adicionales con 16 onzas de agua cada uno

PASO 3 Aproximadamente **una hora** después de tomar el último comprimido, llene el recipiente proporcionado nuevamente con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

PASO 4 Aproximadamente **30 minutos** después de terminar de beber el segundo recipiente de agua, llene el recipiente proporcionado con 16 onzas de agua (hasta la línea de llenado) y beba toda el agua en un lapso de 30 minutos.

Día 2, dosis 2; en la mañana de la colonoscopia (de 5 a 8 horas antes de la colonoscopia y no antes de 4 horas después de iniciar la dosis 1)

Trague los otros 12 comprimidos con otras 16 onzas de agua

- Continúe bebiendo solo líquidos claros hasta después de la colonoscopia.
- Repita los pasos 2 al 4 del día 1, dosis 1.
- Si presenta síntomas relacionados con el preparado (por ejemplo, náuseas, distensión abdominal o cólicos), tome una pausa o reduzca el ritmo al que bebe el agua adicional hasta que disminuyan sus síntomas.
- Tome todos los comprimidos de SUTAB y el agua al menos dos horas antes de la colonoscopia.



(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

Alimentos permitidos el día ANTERIOR a la colonoscopia

Siga una dieta con pocos residuos y no coma nada después de empezar la preparación intestinal. Consuma los alimentos permitidos, a menos que su médico le recomiende algo diferente.

Lo que PUEDE hacer

- Puede consumir únicamente un desayuno con pocos residuos. Algunos desayunos con pocos residuos son huevos, pan blanco, queso cottage, yogur, sémola de maíz, café y té.
- Puede beber líquidos transparentes.

Lo que NO PUEDE hacer

- No beba leche, ni consuma nada de color rojo o morado.
- No beba alcohol.
- No use otros laxantes mientras toma los comprimidos de SUTAB® (sulfato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de potasio).
- No tome medicamentos por vía oral en el lapso de una hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.
- Si está tomando antibióticos de las familias de la tetraciclina o fluoroquinolona, hierro, digoxina, clorpromazina o penicilamina, tome estos medicamentos al menos 2 horas antes y no menos de 6 horas después de la administración de cada dosis de SUTAB.

Líquidos que PUEDE beber

- Café o té (sin crema ni sustituto no lácteo de crema)
- Jugos de fruta (sin pulpa)
- Postres de gelatina (sin fruta ni cobertura)
- Agua
- Caldo de pollo
- Bebida gaseosa clara (como ginger ale)

Recordatorio importante para los pacientes

- SUTAB es un laxante osmótico indicado para la limpieza del colon en preparación para la colonoscopia en adultos.
- Asegúrese de informar a su médico acerca de todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. SUTAB puede afectar la eficacia de otros medicamentos.
- Los medicamentos que se toman por vía oral pueden no absorberse adecuadamente cuando se ingieren menos de una hora antes del inicio de cada dosis de SUTAB.
- Las reacciones adversas más comunes tras la administración de SUTAB fueron náuseas, distensión abdominal, vómitos y dolor en la parte superior del abdomen.
- Se han notificado casos de pacientes que ingirieron el desecante que contienen los frascos; asegúrese de desechar ambos desecantes según las instrucciones.
- Comuníquese con su proveedor de atención médica si presenta vómitos considerables o signos de deshidratación después de tomar SUTAB o si experimenta arritmias cardíacas o convulsiones.
- Si tiene preguntas acerca del uso de SUTAB, llame a su médico.

(Consulte la otra página para obtener más instrucciones).

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

SU PROCEDIMIENTO

Hora/Fecha: _____

Lugar: _____

Si tiene preguntas, comuníquese con su proveedor de atención médica al: _____

Lea la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento incluidas en el kit.

Para obtener más información sobre este producto, llame al 1-800-874-6756.

