

معلومات مقدم الرعاية الصحية

SUTAB®

أقرص (كبريتات الصوديوم، وكبريتات المغنيسيوم،
وكلوريد البوتاسيوم)
1.479 جم/0.225 جم/0.188 جم

الاسم:

العنوان:

المدينة:

الولاية: الرمز البريدي:

الهاتف: الفاكس:

نظام الجرعات

SUTAB هو جرعة مقسمة (على يومين). يلزم تناول ما مجموعه 24 قرصًا للتحضير التام لتنظير القولون. ينبغي تناول الأقرص في جرعتين بمقدار 12 قرصًا في كل جرعة. يجب شرب الماء مع كل جرعة SUTAB، وشرب كمية إضافية من الماء بعد كل جرعة.



الجرعة الأولى — في اليوم السابق لتنظير القولون

تناول الأقرص مع الماء

الخطوة الأولى افتح زجاجة واحدة محتوية على 12 قرصًا.

الخطوة الثانية املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية). ابتلع كل قرص برشفة من الماء، واشرب كمية الماء بأكملها خلال 15 إلى 20 دقيقة.



لا تظهر الأقرص بالحجم الفعلي.



هام: إذا شعرت بأعراض لها علاقة بالتحضير (مثل، الغثيان، الانتفاخ، التشنج)، توقف أو تمهل في معدل شرب الكمية الإضافية من الماء حتى تتلاشى الأعراض.

اشرب كميات إضافية من الماء

الخطوة الثالثة بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص الأخير، املاً الحاوية المرفقة مرة أخرى بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، ثم اشرب الكمية بالكامل خلال 30 دقيقة.

الخطوة الرابعة بعد 30 دقيقة تقريبًا من شرب ماء الحاوية بالكامل للمرة الثانية، املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح على الحاوية)، ثم اشرب الكمية بالكامل خلال 30 دقيقة.

الجرعة الثانية — يوم تنظير القولون

- استمر في شرب السوائل الشفافة فقط حتى بعد الانتهاء من التنظير.
- في صباح يوم تنظير القولون (5 إلى 8 ساعات قبل تنظير القولون ولكن ليس قبل 4 ساعات من بدء تناول الجرعة الأولى)، افتح الزجاجة الثانية المحتوية على 12 قرصًا.
- كرر الخطوة الأولى والخطوة الثانية من الجرعة الأولى.



لا تظهر الأقرص بالحجم الفعلي.



هام: يجب عليك تناول كافة أقرص SUTAB مع الكميات المطلوبة من الماء قبل ساعتين على الأقل من إجراء تنظير القولون.

