

DANE DOSTAWCY USŁUG MEDYCZNYCH

Nazwa/Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

Miasto: _____

Stan: _____ Kod pocztowy: _____

Nr telefonu: _____ Nr faksu: _____

SUTAB[®]
(siarczan sodu, siarczan
magnezu lub chlorek potasu)
Tabletki
1,479 g/0,225 g/0,188 g

Dawkowanie


SUTAB podawany jest w dawkach podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Do pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są łącznie 24 tabletki. Tabletki będą przyjmowane w dwóch dawkach, z których każda składa się z 12 tabletek. Każdą dawkę SUTAB należy przyjmować popijając wodą oraz konieczne będzie wypicie dodatkowej ilości wody po przyjęciu każdej dawki.



DAWKA 1—w dniu poprzedzającym kolonoskopię

Przyjmij tabletki popijając wodą

KROK 1 Otwórz jedną butelkę zawierającą 12 tabletek.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)



KROK 2 Napełnij dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia). Połknij każdą tabletkę popijając wodą i wypij całą ilość wody w ciągu 15 do 20 minut.

WAŻNE: W przypadku wystąpienia objawów związanych z przygotowaniem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zwolnić prędkość przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.


Wypij dodatkową ilość wody

KROK 3 Po upływie około 1 godziny od momentu połknięcia ostatniej tabletki należy ponownie napełnić pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

KROK 4 Po upływie około 30 minut od opróżnienia drugiego pojemnika wody należy napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

DAWKA 2—w dniu kolonoskopii

- Do czasu wykonania kolonoskopii należy kontynuować przyjmowanie wyłącznie klarownych płynów.
- Rano w dniu kolonoskopii (5 do 8 godzin przed kolonoskopią, lecz nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki 1) należy otworzyć drugą butelkę zawierającą 12 tabletek.
- Powtórzyć KROK 1 do KROKU 4 z dawki 1.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)



WAŻNE: Wszystkie tabletki SUTAB należy przyjąć oraz wypić całość wymaganej ilości wody co najmniej na 2 godziny przed kolonoskopią.

(dodatkowe instrukcje - patrz na odwrocie strony.)

