THÔNG TIN DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tên: _____

Địa chỉ: _____

Thành phố: _____

Tiểu bang: _____ Mã ZIP: _____

Điện thoại: _____ Fax: _____

SUTAB®

Viên thuốc
(sodium sulfate, magnesium sulfate và potassium chloride)
1.479 g/0.225 g/0.188 g

Chế độ dùng thuốc

SUTAB là thuốc dùng theo chế độ phân liều (trong 2 ngày). Phải dùng tổng cộng 24 viên thuốc để chuẩn bị đầy đủ cho thủ tục nội soi đại tràng. Quý vị sẽ chia số viên thuốc thành hai liều để uống, mỗi liều 12 viên. Uống mỗi liều SUTAB với nước, xong uống thêm nước sau khi mỗi liều.

LIỀU 1—Vào ngày trước ngày làm thủ tục nội soi đại tràng

Uống thuốc với nước

BƯỚC 1 Mở 1 lọ trong đó có 12 viên thuốc.

BƯỚC 2 Rót 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (rót nước đến vạch mức đổ đầy). Nuốt từng viên thuốc với một ngụm nước và uống hết ly nước trong vòng 15 đến 20 phút.

Viên thuốc trong hình không đúng với kích thước thực tế.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Nếu quý vị gặp những triệu chứng trong lúc dùng thuốc để chuẩn bị làm thủ tục nội soi này (như buồn nôn, đầy hơi hoặc đau bụng), hãy tạm dừng hoặc uống nước chậm lại cho đến khi những triệu chứng này giảm bớt.

Uống thêm nước

BƯỚC 3 Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau khi uống viên cuối cùng, rót thêm 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (đến vạch mức đổ đầy) và uống hết ly nước này trong 30 phút.

BƯỚC 4 Khoảng 30 phút sau khi uống xong ly nước thứ hai, rót 16 ounce nước vào ly đựng được cung cấp (đến vạch mức đổ đầy) và uống hết ly nước này trong 30 phút.

LIỀU 2—Vào ngày làm thủ tục nội soi đại tràng

- Tiếp tục chỉ dùng chất lỏng trong suốt cho đến sau khi thực hiện xong thủ tục nội soi đại tràng.
- Vào buổi sáng ngày thực hiện thủ tục nội soi đại tràng (từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ trước khi thủ tục nội soi đại tràng bắt đầu và sau 4 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu dùng Liều 1), mở lọ thứ hai trong đó có 12 viên thuốc.
- Lặp lại BƯỚC 1 đến BƯỚC 4 giống như Liều 1.

Viên thuốc trong hình không đúng với kích thước thực tế.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Quý vị phải uống hết tất cả các viên thuốc SUTAB và số lượng nước cần thiết ít nhất 2 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu thực hiện thủ tục nội soi đại tràng.

(Vui lòng xem hướng dẫn bổ túc ở trang kia.)

Vào ngày *trước* ngày thực hiện thủ tục nội soi

Những điều quý vị **ĐƯỢC** làm

- Quý vị có thể ăn sáng với những thức ăn dễ tiêu. Thức ăn dễ tiêu gồm trứng, bánh mì trắng, phô mai cottage, sữa chua, grits (bắp nghiền), cà phê và trà.
- Quý vị có thể dùng chất lỏng trong suốt.

Những điều quý vị **KHÔNG ĐƯỢC** làm

- Không uống sữa hoặc ăn hoặc uống bất cứ thứ gì có màu đỏ hoặc màu tím.
- Không dùng thức uống có cồn.
- Không dùng thuốc nhuận tràng nào khác khi uống thuốc SUTAB® (sodium sulfate, magnesium sulfate và potassium chloride).
- Không uống thuốc nào khác trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu dùng mỗi liều SUTAB.
- Nếu có dùng thuốc kháng sinh tetracycline hoặc fluoroquinolone, chất sắt, digoxin, chlorpromazine hoặc penicillamine, hãy dùng những thuốc này ít nhất là 2 tiếng đồng hồ trước khi dùng mỗi liều SUTAB và 6 tiếng đồng hồ sau khi dùng mỗi liều SUTAB này.

Chất lỏng **ĐƯỢC** uống

- Cà phê hoặc trà (không kem hoặc kem béo thực vật)
- Nước ép trái cây (không có bã)
- Các món tráng miệng có thạch gelatin (không trái cây hoặc topping)
- Nước lã
- Nước súp gà
- Soda màu trong (như nước ngọt có ga ginger ale)

Lưu ý

- SUTAB là thuốc nhuận tràng thẩm thấu được chỉ định để làm sạch đại tràng, chuẩn bị cho thủ tục nội soi đại tràng ở người lớn.
- Nói cho bác sĩ biết tất cả các loại thuốc quý vị dùng, bao gồm cả thuốc theo toa và không theo toa, vitamin và thực phẩm chức năng từ thảo dược. SUTAB có thể ảnh hưởng đến tác dụng của các loại thuốc khác.
- Những thuốc quý vị cần uống có thể không hấp thu được đúng cách khi quý vị uống trong vòng 1 tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu dùng mỗi liều SUTAB.
- Những phản ứng có hại thường gặp nhất sau khi dùng SUTAB là buồn nôn, chướng bụng, nôn và đau bụng trên.
- Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu quý vị bị nôn nhiều hoặc có dấu hiệu mất nước sau khi dùng SUTAB, hoặc nếu quý vị bị loạn nhịp tim hoặc co giật.
- Nếu quý vị có thắc mắc gì về việc dùng SUTAB, vui lòng gọi cho bác sĩ của quý vị.

(Vui lòng xem hướng dẫn bổ túc ở trang kia.)

HƯỚNG DẪN ĐẶC BIỆT TỪ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA QUÝ VỊ

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

THỦ TỤC NỘI SOI CỦA QUÝ VỊ

Ngày/Giờ: _____

Địa điểm: _____

Nếu quý vị có điều gì thắc mắc, vui lòng liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị theo số:

Vui lòng đọc toàn phần Thông tin thuốc theo toa và hướng dẫn dùng thuốc trong bộ thuốc.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này, vui lòng gọi số 1-800-874-6756.

Được cung cấp dưới hình thức hướng dẫn qua

Braintree
THUỘC NHÓM SEBELA PHARMACEUTICALS®

©2021 Braintree Laboratories, Inc. 201-187-v1 Tháng Một năm 2021