

医务人员信息

姓名: _____

地址: _____

城市: _____

州: _____ 邮政编码: _____

电话: _____ 传真: _____

SUTAB[®]

(硫酸钠、硫酸镁
和氯化钾)
药片

1.479 g/0.225 g/0.188 g

给药方案

SUTAB 为分剂量 (2 天) 给药方案。为了完成结肠镜检查准备, 共需要服用 24 片药片。您将分两次服药, 每次服用 12 片药片。每次服用 SUTAB 时必须饮水, 并且在服用每次剂量后都必须饮用额外的水。



第 1 剂 — 结肠镜检查前一天

用水送服药片

第 1 步 打开一个含 12 片药片的药瓶。

第 2 步 在提供的容器中装满 16 盎司的水 (至填充线)。用少量水吞咽每片药片, 并在 15 至 20 分钟内喝掉全部水。



重要事项: 如果您发生与准备检查有关的症状 (如恶心、腹胀或抽筋), 请暂停饮用额外的水或减慢饮水速度, 直到症状减轻为止。

饮用额外的水。

第 3 步 服用最后一片药片约 1 小时后, 再次将提供的容器装满 16 盎司的水 (至填充线), 并在 30 分钟内饮用完毕。

第 4 步 在饮完第二个容器中的水后约 30 分钟, 将提供的容器装满 16 盎司的水 (至填充线), 并在 30 分钟内喝掉全部的水。

第 2 剂 — 结肠镜检查当天

- 在完成结肠镜检查前, 仅可继续饮用澄清液体。
- 在结肠镜检查日的早晨 (结肠镜检查前5至8个小时并且在开始服用第 1 剂药物4小时后), 打开第二瓶含 12 片药片的药瓶。
- 重复第 1 剂药物的步骤 1 到步骤 4。



重要事项: 您必须在结肠镜检查前至少 2 小时服用完所有 SUTAB 药片和所需的水。

(请参阅另一页以获取其他说明。)

