



# SUTAB®

(كبريتات الصوديوم وكبريتات  
المغنيسيوم وكلوريد البوتاسيوم)  
أقراص  
1.479 جم/0.225 جم/0.188 جم

لأغراض تمثيلية فقط.

## نظام الجرعات

يتكون نظام SUTAB العلاجي من جرعة مُقسّمة (على يومين).  
يلزم تناول ما مجموعه 24 قرصًا للتحضير التام لتنظيف القولون. ينبغي  
تناول الأقراص في جرعتين كل منهما 12 قرصًا. يجب شرب الماء مع كل  
جرعة من جرعتي SUTAB، وشرب كمية إضافية من الماء بعد كل جرعة.

### اليوم الأول، الجرعة الأولى - في المساء قبل تنظيف القولون:

ابتلع 12 قرصًا مع أول 16 أونصة من الماء



**الخطوة الأولى** افتح زجاجة واحدة محتوية على 12 قرصًا.  
أزل المادة المُجفّفة وتخلص منها. أخرج المادة المُجفّفة من الزجاجة  
الثانية وأغلقها. استخدم الزجاجة الثانية للجرعة  
الثانية في صباح يوم تنظيف القولون.

**الخطوة الثانية** املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط  
الموضح على الحاوية). ابتلع قرصًا واحدًا كل دقيقة أو دقيقتين. يجب الانتهاء  
من تناول 12 قرصًا و16 أونصة كاملة من الماء في غضون 20 دقيقة.



لا تظهر الأقراص بالحجم الفعلي.

**تنبيه مهم:** إذا شعرت بأعراض لها علاقة بالتحضير (مثل، الغثيان، الانتفاخ،  
التقلصات)، توقف أو تمهل في معدل شرب الكمية الإضافية من الماء  
حتى تتلاشى الأعراض.

اشرب 16 أونصة إضافية من الماء

**الخطوة الثالثة** بعد ساعة واحدة تقريبًا من تناول القرص الأخير، املاً  
الحاوية المرفقة مرة أخرى بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط الموضح  
على الحاوية). واشرب الكمية بأكملها على مدى 30 دقيقة.

**الخطوة الرابعة** بعد 30 دقيقة تقريبًا من الانتهاء من شرب محتوى  
حاوية الماء الثانية، املاً الحاوية المرفقة بمقدار 16 أونصة من الماء (إلى الخط  
الموضح على الحاوية). واشرب الكمية بأكملها على مدى 30 دقيقة.

**اليوم الثاني، الجرعة الثانية - صباح يوم تنظيف القولون (5 إلى 8 ساعات قبل تنظيف  
القولون، ولكن ليس قبل أقل من 4 ساعات من بدء تناول الجرعة الأولى)**

ابتلع الأقراص المتبقية التي يبلغ عددها 12 قرصًا مع 16 أونصة من الماء

- استمر في شرب السوائل الشفافة فقط حتى بعد الانتهاء من التنظيف.
- كرر الخطوات من اثنين إلى أربعة من اليوم الأول، الجرعة الأولى.
- إذا شعرت بأعراض لها علاقة بالتحضير (مثل، الغثيان، الانتفاخ، التقلصات)،  
توقف أو تمهل في معدل شرب الكمية الإضافية من الماء حتى تتلاشى الأعراض.
- انته من تناول كافة أقراص SUTAB والماء قبل  
ساعتين على الأقل من إجراء تنظيف القولون.



لا تظهر الأقراص بالحجم الفعلي.

**azurity®**  
pharmaceuticals

مقدّمة كخدمة تعليمية من

حقوق الطبع والنشر لعام 2026 محفوظة لشركة Azurity Pharmaceuticals, Inc  
SUTAB علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Azurity Pharmaceuticals, Inc

2026 فبراير PP-STB-6543-US-EN-v1-B

سيجري التنظير الدكتور:

العنوان:

تاريخ إجراء التنظير: موعد الوصول: صباحًا/مساءً

تعليقات:

## ما الذي يجب عليك تناوله في اليوم السابق لتنظيف القولون

يُرجى اتّباع نظام غذائي قليل البقايا/الألياف، وعدم تناول  
أي شيء بعد بدء تحضير الأمعاء. تناول الأطعمة المسموح  
بها، ما لم يعط طبيبك تعليمات بخلاف ذلك.

### ما يمكنك فعله

- يمكنك تناول وجبة إفطار قليلة البقايا/الألياف فقط. تشمل  
أطعمة الإفطار قليلة البقايا البيض، والخبز الأبيض، والجبن  
القرش، والزبادي، وجريش الذرة، والقهوة، والشاي.
- يمكنك شرب السوائل الشفافة.

### ما لا يمكنك فعله

- لا تشرب الحليب ولا تأكل أو تشرب أي شيء لونه أحمر أو بنفسجي.
- لا تشرب الكحول.
- لا تتناول مسهلات أخرى خلال فترة تناول أقراص SUTAB.
- لا تتناول أدوية عن طريق الفم في غضون ساعة  
قبل تناول أي من جرعتي SUTAB.
- في حال أخذ مضاد حيوي من نوع تيتراسيكلين أو فلوروكينولون، أو تناول الحديد،  
أو الديدجوكسين، أو الكلوربرومازين، أو البنينيسيلامين، خذ تلك الأدوية قبل تناول كل  
جرعة من جرعتي SUTAB بساعتين على الأقل أو بعدها بما لا يقل عن 6 ساعات.

### السوائل التي يمكن شربها

- القهوة أو الشاي (دون إضافة الحليب أو مبيض القهوة غير المُصنّع من الحليب).
- عصائر الفواكه (دون اللب).
- الحلوى الجيلاتينية (دون فواكه أو إضافات).
- الماء.
- حساء الدجاج.
- المشروبات الغازية الشفافة (مثل مشروب الزنجبيل).

### تذكير مهم للمرضى

- SUTAB هو مسهل تناضحي مخصص لتنظيف القولون من  
أجل التحضير لإجراء تنظيف القولون عند البالغين.
- تأكد من إخبار طبيبك بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية  
التي تُصرف بوصفة طبية أو دون وصفة طبية والفيتامينات والمُكمّلات  
العشبية. قد يؤثر SUTAB على مفعول الأدوية الأخرى.
- قد لا يتم امتصاص الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم بشكل ملائم في حال  
تناولها خلال ساعة واحدة قبل بدء تناول كل جرعة من جرعتي SUTAB.
- أكثر الأعراض الجانبية شيوعًا بعد تناول SUTAB هي الغثيان،  
وانتفاخ البطن، والقيء، وآلام في الجزء العلوي من البطن.
- تم الإبلاغ عن حوادث تناول المرضى للمادة المُجفّفة الموجودة في الزجاجات، ولذلك،  
عليك التأكد من التخلص من كل المواد المُجفّفة في الزجاجتين، وفقًا للتعليمات.
- اتصل بمقدم الرعاية الصحية المتابع لحالتك إذا كنت تعاني من  
قيء شديد أو علامات الجفاف بعد تناول SUTAB أو إذا  
عانيت من عدم انتظام ضربات القلب أو نوبة تشنجية.
- إذا كان لديك أي أسئلة حول تناول SUTAB، اتصل بطبيبك.

لمعرفة المزيد حول هذا المنتج، اتصل على الرقم 1-800-461-7449.

يُرجى قراءة كامل المعلومات الخاصة بوصف الدواء ودليل المعالجة المُرفقين في العبوة.