

Lekarz wykonujący badanie: _____

Adres: _____

Data badania: _____ Godzina zgłoszenia się na badanie: _____

Uwagi: _____

SUTAB®
(siarczan sodu, siarczan magnezu
i chlorek potasu)
Tabletki
1,479 g/0,225 g/0,188 g



Wyłącznie do celów poglądowych.

Co można jeść w dzień POPRZEDZAJĄCY kolonoskopię

Należy stosować dietę ubogoresztkową i nie jeść niczego po rozpoczęciu przyjmowania preparatu do przygotowania jelit. Należy jeść produkty dozwolone, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Co JEST dozwolone

- Można zjeść śniadanie składające się tylko z ubogoresztkowych produktów żywnościowych. Ubogoresztkowe produkty żywnościowe na śniadanie obejmują jajka, biały chleb, twaróg, jogurt, płatki owsiane, kawę i herbatę.
- Można przyjmować klarowne płyny.

Co NIE JEST dozwolone

- Nie wolno pić mleka oraz jeść ani pić niczego o czerwonym lub purpurowym zabarwieniu.
- Nie wolno pić alkoholu.
- Podczas przyjmowania preparatu SUTAB nie wolno przyjmować innych środków przeczyszczających.
- Nie wolno przyjmować doustnych leków w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania każdej dawki preparatu SUTAB.
- W przypadku stosowania antybiotyków tetracyklinowych lub fluorochinolonowych, żelaza, digoksyny, chloropromazyny lub penicylaminy należy je przyjąć na co najmniej 2 godziny przed przyjęciem każdej dawki preparatu SUTAB i nie wcześniej niż po upływie co najmniej 6 godzin od jej przyjęcia.

DOZWOLONE płyny

- Kawa lub herbata (bez śmietanki lub zabielaacza niezawierającego mleka)
- Soki owocowe (bez miąższu)
- Desery w formie galaretki (bez owoców lub przybrania)
- Woda
- Bulion z kurczaka
- Klarowne napoje gazowane (np. gazowany napój z imbirem)

Ważne przypomnienie dla pacjentów

- SUTAB to osmotyczny środek przeczyszczający wskazany do oczyszczania jelita grubego u osób dorosłych w ramach przygotowania do kolonoskopii.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach, w tym wydawanych na receptę i bez recepty, witaminach i suplementach ziołowych. SUTAB może wpływać na działanie innych leków.
- Leki przyjmowane doustnie mogą nie zostać prawidłowo wchłonięte, jeśli będą przyjęte w ciągu 1 godziny przed rozpoczęciem przyjmowania każdej dawki preparatu SUTAB.
- Najczęstsze działania niepożądane po podaniu preparatu SUTAB obejmowały nudności, wzdęcia, wymioty i ból w nadbrzuszu.
- Zgłaszano przypadki spożycia przez pacjentów środka osuszającego znajdującego się w butelkach. Należy pamiętać, aby wyrzucić oba środki osuszające zgodnie z instrukcją.
- W przypadku wystąpienia ciężkich wymiotów lub oznak odwodnienia po przyjęciu preparatu SUTAB, lub w przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub napadów drgawkowych należy skontaktować się z dostawcą usług medycznych.
- W razie jakichkolwiek pytań dotyczących preparatu SUTAB należy zadzwonić do swojego lekarza.

Informacje o tym produkcie można uzyskać, dzwoniąc pod numer 1-800-461-7449.

Należy zapoznać się z całością treści druków informacyjnych oraz instrukcji stosowania leku, które załączono do zestawu.

Dawkowanie

SUTAB podawany jest w dawkach podzielonych (2-dniowy schemat dawkowania). Do pełnego przygotowania do kolonoskopii wymagane są łącznie 24 tabletki. Tabletki będą przyjmowane w dwóch dawkach, z których każda składa się z 12 tabletek. Każdą dawkę preparatu SUTAB należy przyjmować popijając wodą oraz konieczne będzie wypicie dodatkowej ilości wody po przyjęciu każdej dawki.

Dzień 1, dawka 1 — wieczorem na dzień przed zabiegiem kolonoskopii


12 tabletek należy połknąć, popijając pierwszą objętością 16 uncji wody.

KROK 1 Otworzyć jedną butelkę zawierającą 12 tabletek. **Wyjąć i wyrzucić środek osuszający.**

Wyjąć i wyrzucić środek osuszający z drugiej butelki, po czym ją zamknąć. Użyć drugiej butelki jako drugiej dawki rano w dniu kolonoskopii.



KROK 2 Napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia). **Połykać 1 tabletkę co 1 do 2 minut. Przyjmowanie 12 tabletek i całej objętości 16 uncji wody należy zakończyć w ciągu 20 minut.**



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

WAŻNE: W przypadku wystąpienia objawów związanych z preparatem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zmniejszyć tempo przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.

Wypić jeszcze dwie objętości po 16 uncji wody.


KROK 3 Po upływie około **1 godziny** od momentu połknięcia ostatniej tabletki należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

KROK 4 Po upływie około **30 minut** od wypicia zawartości drugiego pojemnika z wodą należy ponownie napełnić dostarczony pojemnik 16 uncjami wody (do linii wypełnienia) i wypić całą ilość wody w ciągu 30 minut.

Dzień 2, dawka 2 — rano w dniu kolonoskopii (5 do 8 godzin przed kolonoskopią, ale nie wcześniej niż po upływie 4 godzin od przyjęcia dawki 1)

Kolejną dawkę 12 tabletek należy połknąć, popijając drugą objętością 16 uncji wody.

- Do czasu wykonania kolonoskopii należy kontynuować przyjmowanie wyłącznie klarownych płynów.
- Powtórzyć krok 2 do kroku 4 z dnia 1, dawki 1.
- W przypadku wystąpienia objawów związanych z preparatem (np. nudności, wzdęcia lub skurcze) należy zrobić przerwę lub zmniejszyć tempo przyjmowania dodatkowej wody do momentu złagodzenia objawów.
- Wszystkie tabletki preparatu SUTAB należy przyjąć oraz wypić wodę na co najmniej na dwie godziny przed kolonoskopią.



Tabletki (rzeczywisty rozmiar nie jest pokazany)

Dostarczone w ramach usług edukacyjnych przez



© 2026 Azurity Pharmaceuticals, Inc.

SUTAB® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Azurity Pharmaceuticals, Inc.

PP-STB-6543-US-EN-v1-E Luty 2026