

의료서비스 제공자 정보

이름: _____

주소: _____

도시: _____

주: _____ 우편번호: _____

전화: _____ 팩스: _____

SUTAB®

(황산나트륨, 황산마그네슘
및 염화칼륨)
정제
1.479 g/0.225 g/0.188 g



이해를 돕기 위한 예시입니다.

**SUTAB 복용 전, 복용 중,
복용 후에** 적절히 수분을
공급하는 것이 좋습니다.

투여 용법

SUTAB 분할 투여(2일간) 요법입니다. 대장내시경 준비를 완료하기 위해 총 24개의 정제가 필요합니다. 1회 투여 용량이 12개의 정제이며, 총 2회 복용하게 됩니다. 각 투여 시 물과 함께 SUTAB를 복용하여야 하며, 각 투여 후 추가로 물을 마셔야 합니다.

제1일, 투여 1 - 대장내시경 전날 저녁

12정을 첫 16온스 물과 함께 삼킵니다

대장내시경 검사 전날, 정제 12개가 들어있는 첫 번째 병을 개봉하고 아래 기술한 대로 SUTAB을 복용하십시오.

1단계 정제 12개가 들어 있는 병 하나를 엽니다. **건조제를 꺼내 폐기합니다.**

두 번째 병에서 **건조제를 꺼내 폐기하고** 병을 닫습니다. 두 번째 병은 대장내시경 당일 오전에 두 번째 용량을 위해 사용합니다.



2단계 제공된 용기에 물 16온스를 채웁니다(채우는 선까지).



정제는 실제 크기대로 표시되지 않았습니니다.



1~2분마다 정제 1개를 삼킵니다. 20분 내에 정제 12개 복용을 마치고 16온스 물을 전부 마셔야 합니다.

중요: 준비와 관련된 증상(예: 메스꺼움, 팽만감 또는 경련)을 경험하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.

16온스 물을 추가로 2번 더 마십니다

3단계 마지막 정제를 복용한 지 약 **1시간** 후, 제공된 용기를 다시 16온스의 물로 채워(채우는 선까지) 30분에 걸쳐 모두 마십니다.

4단계 두 번째로 용기의 물을 모두 마시고 약 **30분** 후, 제공된 용기에 물을 16온스 채워(채우는 선까지) 30분에 걸쳐 모두 마십니다.

제2일, 투여 2 - 대장내시경 검사일 아침 (대장내시경 검사 5~8시간 전, 그리고 투여 1을 시작한지 적어도 4시간 후)

나머지 12정을 다시 16온스 물과 함께 삼킵니다

- 대장내시경이 끝날 때까지 맑은 액체류만 마십니다.
- 제1일, 투여 1의 2~4단계를 반복합니다.
- 준비와 관련된 증상(예: 메스꺼움, 팽만감 또는 경련)을 경험하는 경우, 증상이 줄어들 때까지 추가로 물을 마시는 것을 잠시 중단하거나 속도를 늦추십시오.
- 대장내시경 검사 최소 2시간 전까지 SUTAB 정제를 모두 복용하고 물을 마셔야 합니다.



정제는 실제 크기대로 표시되지 않았습니니다.



