

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Название: _____

Адрес: _____

Город: _____

Штат: _____ Индекс: _____

Телефон: _____ Факс: _____

SUTAB®

(натрия сульфат, магния сульфат
и калия хлорид)
таблетки
1,479 г/0,225 г/0,188 г



Только для ознакомительных целей.

Вам рекомендуется **пить воду**
в достаточном количестве до,
во время и после приема SUTAB.

Режим дозирования

Препарат SUTAB принимается в течение двух дней. В общей сложности для полной подготовки к колоноскопии требуется 24 таблетки. Вам следует принять две дозы, по 12 таблеток каждая. Каждую дозу препарата SUTAB надо обязательно запивать водой. После каждой дозы обязательно следует выпить дополнительное количество воды.

День 1, доза 1: вечером в день перед колоноскопией

Примите 12 таблеток и запейте первыми 16 унциями (473 мл) воды

За день до колоноскопии откройте первый флакон с 12 таблетками и примите SUTAB, как описано ниже.

ШАГ 1. Откройте 1 флакон с 12 таблетками. **Удалите и выбросьте влагопоглотитель.**

Удалите и выбросьте влагопоглотитель из второго флакона и закройте флакон.

Используйте второй флакон для приема второй дозы утром в день колоноскопии.

ШАГ 2. Налейте в стаканчик, поставляемый вместе с таблетками, 16 унций (473 мл) воды (до риски).

Принимайте по 1 таблетке каждые 1-2 минуты.
Вам нужно принять 12 таблеток и выпить все 16 унций (473 мл) воды в течение 20 минут.



Размер таблеток, представленных на рисунке, отличается от реального.



ВАЖНО! Если у вас появились симптомы, связанные с подготовкой к исследованию (например, тошнота, вздутие живота или спазмы), сделайте небольшую паузу или пейте дополнительное количество воды медленнее, пока симптомы не ослабнут.

Выпейте дополнительные две порции по 16 унций (473 мл) воды

ШАГ 3. Приблизительно через **1 час** после приема последней таблетки снова наполните стаканчик, поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (473 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в течение 30 минут.

ШАГ 4. Приблизительно через **30 минут** после того как будет выпит второй стаканчик воды, наполните стаканчик, поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (473 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в течение 30 минут.

День 2, доза 2: утром в день колоноскопии (за 5–8 часов

до колоноскопии и не раньше чем через 4 часа после начала приема дозы 1)

Примите еще 12 таблеток и запейте их 16 унциями (473 мл) воды

- До завершения колоноскопии употребляйте только прозрачные жидкости.
- Повторите шаги 2–4, перечисленные для приема дозы 1 в день 1.
- Если у вас появились симптомы, связанные с подготовкой к исследованию (например, тошнота, вздутие живота или спазмы), сделайте небольшую паузу или пейте дополнительное количество воды медленнее, пока симптомы не ослабнут.
- Вы должны принять все таблетки SUTAB и выпить все необходимое количество воды не менее чем за два часа до колоноскопии.



Размер таблеток, представленных на рисунке, отличается от реального.



(См. дополнительные указания на следующей странице.)

